

Preparo Tomografia de Abdome

Prezado Cliente

Exame realizado somente com contraste

2 horas de jejum.
5 copos de água antes do exame.
Chegar 30 minutos de antecedência.

No dia do exame trazer:

RG;
CPF;
Carteira do convênio;
Pedido médico assinado, carimbado e sem rasuras;
Planos que necessitam de autorização prévia, trazer guia autorizada e válida na data do exame;

ATENÇÃO MULHERES: VERIFICAR DATA DA ÚLTIMA MENSTRUÇÃO, POIS É PROIBIDO A REALIZAÇÃO DESTE EXAME ESTANDO GESTANTE OU COM SUSPEITA, EXCETO COM AUTORIZAÇÃO MÉDICA POR ESCRITO.

ORIENTAÇÃO PARA PACIENTES ALÉRGICOS, QUE FOREM REALIZAR TOMOGRAFIA COM CONTRASTE

Para pacientes com renite devido à poeira ou mudança de tempo não há indicação do preparo antialérgico, caso esteja em crise reagendar o exame.

Alérgicos a iodo sem edema de glote, realizar kit antialérgico para utilização de contraste.

Portadores de asma sem crise há mais de 2 semanas, realizar kit antialérgico para utilização do contraste.

Paciente que fazem uso de bombinha deve trazê-la caso necessite após o procedimento

Observação

Pacientes que for Diabético e precisar fazer uso do kit ante antialérgico pegar A CARTA do médico com autorização para realizar o uso dos medicamentos (Prednisona 20mg e Allegra 180mg) já que os mesmo pode ocorre uma alteração e m sua glicemia.

Pacientes com idade acima de 60 anos, com hipertensão, Diabetes, cirurgia renal e que façam hemodiálise fazer exame de creatinina e ligar na clínica um dia antes para o setor de tomografia e informar ao profissional de plantão para que seja realizado o cálculo do clearance de creatinina. (Exame de Creatinina validade de 3 mês),

Pacientes com hipertireoidismo trazer exames de T4 e TSH. (Validade de 1 mês) e observar se está dentro do padrão limite.

Em caso de Dúvidas sobre reações alérgicas ligar no setor de Tomografia.

O setor de Tomografia irá entrar em contato um dia antes da data do exame agendado para reorientar todos os cuidados pré exame de Tomografia com contraste, só no caso de pacientes que sinalizar algum tipo de alergia.